

فره تریاژ بیمارستانی ESI

نقطه تصمیم گیری A: (سطح ۱)

سوال: آیا بیمار در حال مرگ است؟		<input type="radio"/> بله	<input type="radio"/> خیر
بررسی های فوری:	علائم و نشانه های خطر	قابل قبول	
A- وضعیت راه هوایی		<input type="radio"/>	
B- وضعیت تهویه		<input type="radio"/>	
C- وضعیت گردش خون		<input type="radio"/>	
D- تغییرات سطح پاسخ دهی		<input type="radio"/>	

نقطه تصمیم گیری B: (سطح ۲)

آیا بیمار وضعیت بحرانی دارد؟	<input type="radio"/> بله	<input type="radio"/> خیر
آیا بیمار گیج، خواب آلوده یا بدون پاسخ است؟	<input type="radio"/> بله	<input type="radio"/> خیر
آیا بیمار دچار درد شدید است؟	<input type="radio"/> بله	<input type="radio"/> خیر
علائم همراه با درد چیست؟	<input type="radio"/> تهوع <input type="radio"/> استفراغ <input type="radio"/> تعریق <input type="radio"/> تاکیکاردی <input type="radio"/> اسپاسم عضله <input type="radio"/> سایر.....	<input type="radio"/> ندارد
آیا بیمار احتمالاً نیاز به اتاق عمل دارد؟	<input type="radio"/> بله	<input type="radio"/> خیر

بیمار چه مدت می تواند منتظر پزشک و اقدامات درمانی بماند؟ ۱.....۲.....۳.....۴.....۵.....۶.....۷.....۸.....۹.....۱۰ (دقیقه)

نقطه تصمیم گیری C: (سطوح ۳ و ۴ و ۵)

اقدامات روتین	روش های تشخیصی / درمانی که احتمال دستور آن برای مددجو وجود دارد:
<input type="radio"/> گرفتن شرح حال	آزمایشات تشخیصی خاص:
<input type="radio"/> معاینه بیمار	رادیوگرافی <input type="radio"/> سونوگرافی <input type="radio"/> CT اسکن <input type="radio"/> MRI <input type="radio"/> اسکن <input type="radio"/> سایر.....
<input type="radio"/> رگ گیری (هپارین لاک)	انفوزیون وریدی <input type="radio"/> داروهای تزریقی <input type="radio"/>
<input type="radio"/> تجویز داروهای خوراکی	پانسمان تخصصی <input type="radio"/> بخیه زدن <input type="radio"/>
<input type="radio"/> مراقبت ساده از زخم	مشاوره تخصصی <input type="radio"/> نام مشاوره مورد نیاز:
<input type="radio"/> آزمایشات روتین بیمارستان	پروسیجرهای ساده (سونداژ، لوله معده) <input type="radio"/> نام پروسیجر:
<input type="radio"/> نسخه نویسی	پروسیجرهای پیچیده (کشیدن مایع نخاع، برونکوسکوپی...) <input type="radio"/> نام پروسیجر:

تعیین سطح تریاژ بر اساس تعداد منابع تشخیصی/درمانی مورد نیاز:

سطح ۳: تحت نظر (نیاز به دو یا چند روش تشخیصی/درمانی)	سطح ۴ (یک روش)	سطح ۵ (هیچ)
نقطه تصمیم گیری D - (تصمیم گیری بین سطح ۲ و ۳)		
معیار خطر در نوزاد	معیار خطر در زیر ۸ سال	معیار خطر در بالغین
۱۸۰ <	۱۴۰ <	۱۰۰ <
۴۰ <	۳۰ <	۲۰ <
٪۹۲ >	٪۹۲ >	٪۹۲ >
سطح ۳: تحت نظر		
سطح ۲: پایش دقیق و تعیین مجدد مدت زمان انتظار برای اقدامات درمانی: ۱.....۲.....۳.....۴.....۵.....۶.....۷.....۸.....۹.....۱۰ (دقیقه)		

نام پرستار تریاژ:

امضا و مهر:

تعیین سطح تریاژ توسط پرستار سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ سطح ۵